

# biottrinsic™ PK-Release

Dodatek do gleby zgodnie z § 2 ustawy o nawozach z wykorzystaniem żywych mikroorganizmów.

Główny składnik: *Poenibacillus mucilaginosus*  $\geq 0,12 \times 10^8$  jtk/ml

Przeznaczenie: Optymalizacja podaży i fosforu i potasu oraz dostępności składników odżywczych, poprawa aktywności biologicznej, struktury gleby i plonów.

## Producent:

Indigo Agriculture Deutschland GmbH  
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf  
Handelsregister HRB 116741  
Email: indigoeurope@indigoag.com  
Tel: +49 157 67089171 und +49 152 555378285

## Główny składnik: Bakterie

Pozostałe składniki: melasa z buraków cukrowych, woda z pęcznienia kukurydzy, sole sodowe, sól mineralna, glicyna, woda

Zawartość składników odżywczych, materii organicznej i podstawowych składników				
Składnik	Zawartość (% s.m.)	Progi znakowania (% s.m.)		Tolerancja
Azot (N)	0,056 %	0,1 %		50 %, 1 %-Punkt
Fosforany (P, O <sub>2</sub> )	0,106 %	0,1 %		50 %, 1 %-Punkt
Potas (K, O)	0,172 %	0,1 %		50 %, 1 %-Punkt
Materia organiczna	0,015 %	5,0 %		50 %, 5 %-Punkt
Podstawowe składniki aktywne (CaO)	0,113 %	5,0 %		50 %, 2,5 %-Punkt
Zawartość suchej masy	1,45 %			
pH	8,19			
Składniki pomocnicze				
Magnez (Mg)	0,0140 %	0,1		50 %, 1 %-Punkt
Siarka (S)	0,0275 %	0,1		50 %, 1 %-Punkt
Bor (B)	0,0188 %	0,01		20 %, 0,40 %-Punkt
Miedź (Cu)	-	0,05		20 %, 0,40 %-Punkt
Cynk (Zn)	-	0,1		20 %, 0,40 %-Punkt
Kobalt (Co)	-	0,004		20 %, 0,40 %-Punkt
Selen (Se)	-	0,0005		25%

## Zalecenia dotyczące stosowania

Uprawa	Aplikacja PK-Release samodzielnie w ml/dt nasion	Aplikacja PK-Release samodzielnie doglebowo lub dolistnie w l/ha	W mieszaninie z N-Collect w ml/dt nasion	W mieszaninie z N-Collect przy aplikacji doglebowej lub dolistnej w l/ha
Kukurydza	Po konsultacji	1,0	Po konsultacji	0,5
Zboża (jare i ozime)	400	1,0	200	0,5
Ziemniaki	-	1,0	-	0,5
Buraki cukrowe	-	1,0	-	0,5
Motylkowate	400	1,0	200	0,5

### » Przed otwarciem mocno wstrząsnąć pojemnikiem.

» Zaprawianie nasion: Należy równomiernie PK-Release, przestrzegając dawki aplikacji.

» Aplikacja doglebowa/dolistna: Stosować PK-Release za pomocą opryskiwacza jesienią lub wiosną przy pochmurnej pogodzie i temperaturze gleby powyżej 5°C.

» Np. w zbożach - powschodowo do BBCH 31; rzepak - powschodowo do BBCH 18; ziemniakach - powschodowo do BBCH 39.

» W przypadku stosowania w ziemniakach nie używać w mieszaninach z produktami zawierającymi miedź.

### Przechowywanie:

» Przechowywać w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu.

» Opakowanie należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed użyciem. Częściowo opróżnione opakowanie należy hermetycznie zamknąć po użyciu i niezwłocznie zużyć.

**Nie przekazywać w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 25°C.**

### Inne informacje:

Masa netto: (patrz nadruk na opakowaniu) Numer partii: (patrz nadruk na opakowaniu)

Data produkcji: (patrz nadruk na opakowaniu)

Data ważności: co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji

**Produkt nie zawiera GMO**